

ประเด็นยุทธศาสตร์	ส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสุขภาพดี					
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์	ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพที่ดี เป็นกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง					
รายการข้อมูล	ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก					
มิติข้อมูล	<input type="checkbox"/> Risk Factors (ปัจจัยเสี่ยง) <input type="checkbox"/> Protective Factors (ปัจจัยการป้องกัน) <input checked="" type="checkbox"/> Promoting Intervention (กิจกรรมการส่งเสริม) <input type="checkbox"/> Health Outcomes (ผลลัพธ์ทางสุขภาพ) <input type="checkbox"/> Life Impact (ผลกระทบต่อการดำรงชีวิต)					
คำนิยาม	<ul style="list-style-type: none"> เด็กอายุ 6-12 ปี หมายถึง เด็กที่มีอายุ 6 ปีเต็ม ถึง 12 ปี 11 เดือน 29 วัน ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก หมายถึง ยาเม็ดที่มีส่วนประกอบของ elemental iron 60 มิลลิกรัมต่อเม็ด 					
เกณฑ์เป้าหมาย						
	หน่วยวัด	ปีงบประมาณ				
		2566	2567	2568	2569	2570
	ร้อยละ	≥ 50	≥ 51	≥ 52	≥ 53	≥ 54
วัตถุประสงค์	เพื่อเฝ้าระวังการได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน					
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	เด็กวัยเรียน อายุ 6-12 ปี					
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> รวบรวมข้อมูลเด็กอายุ 6 – 12 ปี ที่ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก โดยคำนวณปริมาณ ให้เพียงพอสำหรับการกินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนถึงวันที่เด็กจะได้รับบริการในครั้งต่อไป รพ. PCU ของ รพ. และ รพ.สต. บันทึกรหัสยาและข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น JHCIS, HosXP PCU เป็นต้น เพื่อส่งออกข้อมูลตามโครงสร้าง 43 แฟ้ม (แฟ้ม DRUG) - DRUG ใช้ประเมินการได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก (รหัสยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กตามรายการแนบท้าย) 					
แหล่งข้อมูล	<ol style="list-style-type: none"> โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกสังกัด ระบบ Health Data Center (HDC SERVICE) กระทรวงสาธารณสุข 					
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนเด็กอายุ 6 - 12 ปี ที่ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก (รหัสยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ตามรายการแนบท้าย)					
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนเด็กอายุ 6 - 12 ปี ทุกคนทั้งหมดที่ชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูงจากแฟ้ม Nutrition (ที่ไม่ใช่กลุ่มเด็กป่วย)					
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก = (A/B) X 100					
ระยะเวลาประเมินผล	ทุก 6 เดือน (รอบที่ 1 เดือน ต.ค. - มี.ค. และรอบที่ 2 เดือน เม.ย. - ก.ย.)					
เกณฑ์การประเมิน : พ.ศ. 2566						
	รอบ 3 เดือน	รอบ 6 เดือน	รอบ 9 เดือน	รอบ 12 เดือน		
	-	≥ 50	-	≥ 50		
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล	สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง					
วิธีการประเมินผล :	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานจากระบบฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุขกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
เอกสารสนับสนุน :	<ol style="list-style-type: none"> คู่มือแนวทางการควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก สำนักโภชนาการ กรมอนามัย WHO Guideline: Intermittent iron supplementation in preschool and school-age children 2011. 					

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน						
Baseline data	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ				
		2561	2562	2563	2564	2565
เด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก	ร้อยละ	-	21.60	32.5	29.57	25.14
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	นายแพทย์ธีรภัทร อัครวิจิตรระการ โทร 0 2590 4306 แพทย์หญิงสุนิสา สกลนันท์ โทร 0 2590 4944 นางสาววิภาศรี สุวรรณผล โทร 0 2590 4945 นายภาสกร สุระผัด โทร 0 2594 4940 นางสาวกุลธิดา รักกลัด โทร 0 2590 4335	โทรสาร 0 2590 4339 โทรสาร 0 2590 4339 โทรสาร 0 2590 4339 โทรสาร 0 2590 4339 โทรสาร 0 2590 4339				
หน่วยงานประมวลผลจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)	1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2. กองแผนงาน กรมอนามัย 3. สำนักโภชนาการ กรมอนามัย					
ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน	นายแพทย์ธีรภัทร อัครวิจิตรระการ โทร 0 2590 4306 นางสาววิภาศรี สุวรรณผล โทร 0 2590 4945 นางสาวกุลธิดา รักกลัด โทร 0 2590 4335	โทรสาร 0 2590 4339 โทรสาร 0 2590 4339 โทรสาร 0 2590 4339				
หน่วยงานนำเข้าข้อมูลส่วนกลาง	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข					
หน่วยงานนำเข้าข้อมูลส่วนภูมิภาค	สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด					
การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	ใช้เป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์การได้รับธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กลดลง และมีความฉลาดทางสติปัญญาไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน					
การเผยแพร่ข้อมูล	DoH Dashboard และ HDC SERVICE					

หมายเหตุ : 1. หลักเกณฑ์การจ่ายยา หน่วยบริการสาธารณสุขจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กทุกครั้งที่ทำให้บริการตามบริบทของพื้นที่ โดยจ่ายยาให้เพียงพอกับปริมาณที่กำหนดตามคำแนะนำ (คู่มือแนวทางการควบคุม และป้องกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก) โดยคำนวณให้กินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

2. ชื่อยาทางการค้า และรหัสยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก รหัสยา 24 หลัก (ใช้รหัสยา 19 ตัวแรก) ดังนี้

ชื่อยาทางการค้า	รหัสยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก รหัสยา 24 หลัก
EUROFER	202030120137819920381422
FEMARATE	100488000004203120381169
FERROTABS	100489000004320121881267
BEFERMED	100489000004320121881267
F-TAB	100488000004203121781674 100488000004203120381442
FERROUS FUMARATE	100488000004203120381013
FERMIRON	100488000004203120381053
I - RON	100488000004203120381144
FERRA	100488000004203120381271
FERMATE	100488000004203120381341

ชื่อยาทางการค้า	รหัสยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก รหัสยา 24 หลัก
FEROUS FUMARATE TABLET	100488000004203120381626 100488000004203121881626
I-IRON-F	100488000004203121781144
FER - TAB	100488000004203121881442
FERMASIAN S/C	100488000004203121881553
FERROUS SULFATE	100489000004192121881506 100489000004320120381122 100489000004320120381506 100489000004203120381555
FERROUS SULFATE FILM COATED	100489000004203120381084
FERROUS SULPHATE	100489000004203120381144 100489000004203120381619 100489000004203120381477 100489000004203120381544 100489000004203120381546